



AGRO - CYPERMETRINA

250 EC INSECTICIDA PIRETROIDE

COMPOSICION:

Cypermctrina (i.a.) 25% (1)
 Inertes c.s.p.....1000 cm3.
 (1) equivale a 250 gr. i.a./lt.

TOXICIDAD: Baja toxicidad para humanos

DL 50
 Oral aguda 700-4000 mg/kg. PV
 Dermal 1600 - 2400 mg/kg. PV

ACCION:

Contacto e ingestión
 volteo inmediato, activo
 incluso en insectos
 resistentes a insecticidas
 tradicionales.



RECOMENDACIONES DE USO:

No tiene acción de vapor:
 es importante una buena
 aplicación y ver que el
 producto entre en contacto
 con el insecto.



COMPATIBILIDAD:

Puede aplicarse en mezclas con insecticidas fosforados. Puede mezclarse con el herbicida PROPANIL.

RESTRICCIONES DE USO:

Aplicar 10 días antes de las cosechas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

No debe ingresar al lugar tratado antes de las 24 horas.

ANTIDOTO:

No existen casos de intoxicación humana con este producto, tiene un margen de seguridad muy grande. Produce apenas algunas alergias sensaciones de adormecimiento alrededor de la boca, desaparece espontáneamente en pocas horas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		INDICACIONES
		cc./ha.	cc./20 L. agua	
Soya	Anticarsia	50-200	2 - 7	Preventivo al inicio de la vegetación. Al momento de la eclosión de huevos Primeros estadios de la larva.
Algodón	Pulgón Trip.			
Maíz	Alabama			
Arroz	Falso medidor			
Trigo	Heliothis petilla			
Girasoll	Chinche			
Sorgo	Lagarta rosada			
Frutales	Cogollero			
Hortalizas	Pollillas			
	Bellotera			
	Mosca de la fruta			
	Cortadores			

