



AGRO - MONOCROTOFOS

60 LC INSECTICIDA SISTEMICO ORGANOFOSFORADO

COMPOSICION:

Monocrotofos (i.a.).....60% (1)
 Inertes c.s.p.....1000 c.c.
 (1) equivale a 600 grs/litro

TOXICIDAD:

DL 50
 Oral aguda 8-23 mg/kg. PV
 Dermal 354 mg/kg. PV

ACCION:

Insecticida sistémico de contacto e ingestión de rápida acción contra un amplio espectro de plagas, activo como veneno estomacal y como veneno de contacto. La acción de contacto se mantiene por algunos días, al penetrar el ingrediente activo en los tejidos de la planta actúa como insecticida sistémico.

RECOMENDACIONES DE USO:

Insecticida de amplio espectro.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas excepto los alcalinos.

RESTRICCIONES DE USO:

Aplicar entre 15-20 días antes de las cosechas.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

No debe ingresar al lugar tratado antes de las 24 horas.

ANTIDOTO:

Atropina. Ingestión elevada: PROVOQUE VOMITO.



CULTIVO	PLAGA	DosisLt/Ha	INDICACIONES
Soya Frejol Girasol	Masticadores Barrenadores Chupadores	0,5 - 1	Tratar con rapidez a la aparición de los parásitos Aplice cuando las larvas estén entre el 1er. y 3er. estadio de crecimiento 50cc. Producto en 20 litros de agua.
Trigo Aroz	Masticadores Barrenadores Chupadores	0,5 - 1	
Maíz Sorgo	Chupador Cogollero, Militar Barrenador	0,5 - 1	
Algodón	Chupadores Masticadores Perforadores Gusano bellotero	0,5 - 1	
Papa Tomate	Pulgones Trips Comedores de hojas Polillas	0,5 - 1	