



# AGRO - PARAQUAT

200 SA HERBICIDA TOTAL DE CONTACTO

## COMPOSICION:

Paraquat (i.a.)..... 20% (1)

Inertes c.s.p..... 100 cm<sup>3</sup>.

(1) equivale a 200 gr. i.a./lt.

## TOXICIDAD:

DL 50      Oral aguda en ratas      150 mg/kg PV  
              Dermal en conejos      500 mg/kg PV

## ACCION:

Es un herbicida que actúa sobre tejidos verdes de la planta destruyendo la clorofila, causando secado de hojas y muerte de la planta. De acción rápida a temperatura alta y con buena luminosidad. Se inactiva en el suelo.

## RECOMENDACIONES

### DE USO:

Para maduración uniforme del cultivo, reduce las pérdidas causadas por impurezas y humedad recide en 2 semanas la cosecha.

### LIMITACIONES DE USOS:

No alimentar al ganado con residuos de herbicidas, no aplicar en papas para semilla.

### COMPATIBILIDAD:

Incompatible con alcalinos.

CULTIVO	LT/Ha.	APLICACION
Soya	1 - 2	Deseccación de madurez fisiológica 70% de vainas café rojizas entre 18-20 días antes de la cosecha.
Algodón	1.25 - 2.5 1.5 - 2.5 0.5 1.0	En Pre emergencia como secante
Maíz	1 - 2	Dirigida: Cuando tenga + 0 - 50 cm. de tamaño. defoliante + 1 lt. coadyuvante catiónico con 80% de bolos abiertos.
Caña de azúcar	1.5 - 5	Tres días antes de la siembra puede agregar 2,4-D sal amina
Areas no cultivadas	2 - 5	Solo o en mezclas para control total

